

Homologie relative ; Mayer-Vietoris

Exercice 1. Compléments sur l'homologie relative

Soit (X, A) une paire topologique.

1. Montrer que $H_0(X, A) = 0$ si et seulement si A rencontre toutes les composantes connexes par arcs de X .
2. Montrer que $H_1(X, A) = 0$ si et seulement si l'application $H_1(A) \rightarrow H_1(X)$ est surjective et toute composante connexe par arcs de X contient au plus une composante connexe par arcs de A .
3. On suppose que A est un point. Calculer l'homologie réduite $H_*(X, A)$ en fonction de l'homologie de X .
4. On suppose que A est un rétract de X . Montrer que l'application $H_n(A) \rightarrow H_n(X)$ induite par l'inclusion $A \hookrightarrow X$ est injective.

Exercice 2. Suites exactes longues en cohomologie

Soit (X, A, B) un triplet d'espaces topologiques avec $B \subseteq A \subseteq X$.

1. Montrer que la suite suivante est exacte :

$$\cdots \xrightarrow{d_{k+1}} H_k(A, B) \xrightarrow{i_{*,k}} H_k(X, B) \xrightarrow{j_{*,k}} H_k(X, A) \xrightarrow{d_k} H_{k-1}(A, B) \xrightarrow{i_{*,k-1}} \cdots$$

où les applications $i : (A, B) \rightarrow (X, B)$ et $j : (X, B) \rightarrow (X, A)$ sont fournies par l'inclusion $A \hookrightarrow X$ et l'identité $X \rightarrow X$, respectivement, et d_k est la composition

$$H_k(X, A) \xrightarrow{\delta_k} H_{k-1}(A) \rightarrow H_{k-1}(A, B)$$

des morphismes qui proviennent des suites exactes des paires (X, A) et (A, B) .

2. En déduire la suite exacte de la paire (X, A) pour les groupes d'homologie réduits.

Exercice 3. Bouquet d'espaces

Soient (X, x) et (Y, y) deux espaces topologiques pointés. On note $X \vee Y$ et on appelle *bouquet* de (X, x) et (Y, y) le recollement de X et Y selon leurs points bases : $X \amalg Y / (x \sim y)$.

On suppose que x et y admettent des voisinages contractiles dans X et Y respectivement. Calculer l'homologie de $X \vee Y$ en fonction des homologies de X et Y .

Exercice 4. Homologie du parachute

Calculer l'homologie de l'espace obtenu en identifiant les sommets du simplexe standard Δ^2 .

Exercice 5. Cône, Suspension

Soit X un espace topologique pointé. On appelle *cône* de X et on note CX l'espace quotient $X \times [0, 1] / X \times \{1\}$. On appelle *suspension* de X et on note ΣX l'espace quotient $CX / X \times \{0\}$.

1. Montrer que CX est toujours contractile.
2. Calculer ΣX pour $X = S^n$.
3. Calculer l'homologie de ΣX en fonction de l'homologie de X . En déduire un calcul de l'homologie des sphères.

Exercice 6. Tore et bouquet d'espaces

Montrer que le tore $T^2 = S^1 \times S^1$ et l'espace $S^1 \vee S^1 \vee S^2$ ont les mêmes groupes d'homologie singulière mais ne sont pas homotopiquement équivalents.

Exercice 7. Homologie d'espaces pathologiques

Calculer l'homologie de la droite à deux origines, puis à n origines. Calculer l'homologie de l'adhérence dans $\mathbb{R}^2$ du graphe de $x \mapsto \sin(1/x)$.