

---

**TD 13 - Final**


---

**Exercice 1.***Stop*

Étant donné une machine de Turing  $M$  et un entier  $n$ , dire si les problèmes suivants sont décidables ou non :

1. Étant donné un mot  $\omega$ ,  $M$  s'arrête-t-elle sur  $\omega$  en moins de  $n$  étapes de calcul ?
2.  $M$  s'arrête-t-elle en moins de  $n$  étapes de calcul pour tout mot  $\omega$  ?
3.  $M$  calcule la fonction constante  $n$ .
4.  $M$  boucle-t-elle sur l'entrée vide ? On dit qu'une machine de Turing *boucle* sur la donnée  $\omega$  si  $M$  passe deux fois dans la même configuration.

**Exercice 2.***Politique Commune de la Pêche*

1. Montrer que le problème de correspondance de Post reste indécidable lorsque tous les mots des deux séquences ont pour longueur au plus 2.
2. Qu'en est-il si tous les mots ont pour longueur 2 ?

**Exercice 3.***Récursion*

Soit  $E$  une partie de  $\mathcal{N}$  infinie récursivement énumérable, et  $f$  une fonction l'énumérant.

1. Montrer que  $E$  est récursivement énumérable sans répétitions.
2. Montrer que si  $f$  est croissante, alors  $E$  est récursif.
3. Montrer que  $E$  est la projection d'un ensemble récursif.

**Exercice 4.***Indépendance*

On considère la théorie  $\mathcal{T}$  (du premier ordre) dont le langage est formé par un symbole de prédicat  $p$  d'arité 2, et dont les axiomes sont :

- $$(A_1) \quad \forall x \neg p(x, x)$$
- $$(A_2) \quad \forall x \forall y \forall z (p(x, y) \wedge p(y, z) \Rightarrow p(x, z))$$
- $$(A_3) \quad \forall x \forall y [p(x, y) \Rightarrow \exists z (p(x, z) \wedge p(z, y))]$$

1. Donner un modèle de  $\mathcal{T}$ .
2. Montrer que les trois axiomes sont indépendants.

On considère maintenant la théorie  $\mathcal{T}' = \mathcal{T} \cup \{p(a, b)\}$  ( $A_4$ ) où  $a$  et  $b$  sont des constantes.

3. Montrer que tout modèle de  $\mathcal{T}'$  est infini.
4. Montrer que pour tout  $i \in \{1; 2; 3; 4\}$ , la théorie  $\mathcal{T}_i = \mathcal{T}' \setminus A_i$  ( $\mathcal{T}'$  privé de l'axiome  $A_i$ ) admet en revanche un modèle fini. On exhibera un tel modèle pour chaque valeur de  $i$ .

**Exercice 5.**

Soit  $f$  la fonction définie par :  $f(x) = \min\{p \mid \phi_p() = x\}$

1. Montrer que  $f$  est totale.
2. Montrer que  $f$  n'est pas calculable.

Soit  $g$  la fonction définie par :  $g(p) = \max\{\phi_q() \mid q \leq p\}$

3. Montrer que  $g$  est définie à partir d'un certain rang.
4. Montrer que  $g$  n'est pas calculable.