# *La logique propositionnelle classique*

*version du 9 janvier 2001 – 21 h 14*

# En déduction naturelle

On ajoute la règle dite de réduction par l'absurde.

$$RAA \quad \frac{\Gamma, \neg p \vdash \bot}{\Gamma \vdash p}$$

Attention : il ne faut pas confondre cela avec

$$\frac{\Gamma, p \vdash \bot}{\Gamma \vdash \neg p}$$

qui est en fait :

$$\frac{\Gamma, p \vdash \bot}{\Gamma \vdash p \Rightarrow \bot}$$

## Exercice

Prouvez

1. $\neg\neg p \Rightarrow p$
2. $p \vee \neg p$
3. $((p \Rightarrow q) \Rightarrow p) \Rightarrow p$

# Correction et complétude

Interprétation : une fonction de $proposition$ vers $\{0, 1\}$, somme et produit modulo 2.

– $v(p \Rightarrow q)$ = $1 + v(p) + v(p).v(q)$
– $v(p \vee q)$ = $v(p) + v(q) + v(p).v(q)$
– $v(p \wedge q)$ = $v(p).v(q)$
– $\perp$ = 0

$\Gamma \models_{NK} p$ signifie que si $v(q) = 1$ pour tout $q \in \Gamma$ alors $v(p) = 1$

# Correction et complétude (suite)

La logique propositionnelle est correcte,

c-à-d $\Gamma \vdash_{NK} p$ implique $\Gamma \models_{NK} p$

La logique propositionnelle est complète,

c-à-d $\Gamma \models_{NK} p$ implique $\Gamma \vdash_{NK} p$