

---

Feuille d'exercices n° 7a

NOMBRES COMPLEXES (PREMIÈRE PARTIE : SANS LA FORME TRIGONOMETRIQUE)

---

1. Calculs, partie réelle, partie imaginaire, conjugué, module

**Exercice 1.**

1. Calculer  $i^n$ ,  $n \in \mathbf{Z}$ .
2. Calculer  $(1 + i)^8$ .

**Exercice 2.**

1. Écrire le conjugué de  $z = \frac{4 - 5i}{3 + i}$ , puis préciser sa partie réelle et sa partie imaginaire.
2. Soit  $z$  un complexe. Exprimer le conjugué de  $w = \frac{2z^2 - i}{5z + 1}$  en fonction de  $\bar{z}$ .

**Exercice 3.**

1. Pour tout  $z \in \mathbf{C}^*$ , exprimer  $1/z$  sous forme algébrique.
2. Pour tout  $(a, b) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$  et tout  $(c, d) \in \mathbf{R}^2$ , déterminer l'ensemble des  $(x, y) \in \mathbf{R}^2$  vérifiant

$$\begin{cases} ax - by = c, \\ bx + ay = d. \end{cases}$$

**Exercice 4.** On note  $j = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ .

1. Soit  $P$  une fonction polynômiale à coefficients réels, c'est-à-dire qu'il existe un entier naturel  $n$  et des réels  $a_0, a_1, \dots, a_n$  tels que pour tout  $z \in \mathbf{C}$ ,  $P(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$ .  
Soit  $z$  un nombre complexe. Montrer que si  $P(z) = 0$ , alors  $P(\bar{z}) = 0$
2. Calculer  $j\bar{j}$  et  $j + \bar{j}$ .
3. En déduire  $j(-1 - j)$ , puis constater que  $j$  est solution de l'équation  $z^2 + z + 1 = 0$ . Quelle est l'autre solution ?
4. À la lumière des questions précédentes, résoudre l'équation  $z^3 = 1$ , d'inconnue  $z \in \mathbf{C}$ .
5. Sans calculer  $1/j$  ni  $j^2$ , utiliser la question 4. pour justifier que  $\bar{j} = \frac{1}{j} = j^2$ .

**Exercice 5.** Déterminer l'ensemble des nombres complexes  $z$  tels que  $\frac{iz - 1}{z - i}$  soit réel.

**Exercice 6.** Résoudre  $z^2 = \bar{z}$ , d'inconnue  $z \in \mathbf{C}$ .

**Exercice 7.** Soit  $z \in \mathbf{C}$ . Montrer que  $|z - i| = |z + i|$  si et seulement si  $z$  est réel.

**Exercice 8.** Soient  $z$  et  $z'$  deux nombres complexes de module 1 tels que  $zz' \neq -1$ . Démontrer que  $\frac{z+z'}{1+zz'}$  est réel, et préciser son module.

**Exercice 9.** Soient  $u, v$  et  $w$  trois nombres complexes tels que  $|u| = |v| = |w| = 1$ . Établir la relation :

$$|uv + vw + wu| = |u + v + w|.$$

**Exercice 10.**

Soient  $u$  et  $v$  deux nombres complexes distincts tous deux de module 1. Montrer que pour tout complexe  $z$ , le nombre complexe  $\left(\frac{z + uv\bar{z} - (u+v)}{u-v}\right)^2$  est un nombre réel négatif ou nul.

**Exercice 11.**

1. Soit  $P(X) = X^3 + aX^2 + bX + c$  un polynôme à coefficients dans  $\mathbf{C}$ . Pour quelle valeur de  $t \in \mathbf{C}$  le polynôme  $P(X+t)$  est-il de la forme

$$X^3 + 3pX + q$$

avec  $p, q \in \mathbf{C}$  ?

2. Soient  $p, q \in \mathbf{C}$ . On s'intéresse à une méthode de calcul des racines du polynôme  $R = X^3 + 3pX + q$ , dite *méthode de Cardan*. On note  $\alpha$  et  $\beta$  les deux racines, éventuellement égales, du polynôme  $X^2 + qX - p^3$  et  $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$  les trois racines cubiques de  $\alpha$ .

(a) Exprimer  $\alpha + \beta$  et  $\alpha\beta$  en fonction de  $p$  et  $q$ .

(b) Démontrer que  $\gamma_k - \frac{p}{\gamma_k}$  est une racine de  $R$  pour tout  $k \in \{1, 2, 3\}$ .

3. On pose :  $P = X^3 + 3X^2 + 6X + 2$ .

(a) Appliquer à  $P$  le procédé de la question 1.

(b) Déterminer les racines du polynôme  $R$  déduit de  $P$ , puis celles de  $P$ , en exploitant la méthode de Cardan de la question 2.

## 2. Autour des racines carrées

**Exercice 12.** Calculer les racines carrées des nombres complexes suivants :

a)  $\Delta_1 = 49$

b)  $\Delta_2 = -25$

c)  $\Delta_3 = 50i$

d)  $\Delta_4 = 3 + 4i$

e)  $\Delta_5 = 8 - 6i$

**Exercice 13.** Résoudre les équations du second degré suivantes :

a)  $z^2 + 2z + 10 = 0$

b)  $z^2 - 2iz - 1 + 2i = 0$

c)  $iz^2 + (4i - 3)z + i - 5 = 0$ .

**Exercice 14.** Résoudre l'équation suivante :  $z^2 - 2\bar{z} + 1 = 0$ .

**Exercice 15.** On considère l'équation en  $z \in \mathbf{C}$  suivante :  $z^3 + (1 - 3i)z^2 - (6 - i)z + 10i = 0$ .

1. Déterminer une racine réelle  $z_0$  de cette équation.

2. Pour  $z \in \mathbf{C}$ , factoriser  $z^3 + (1 - 3i)z^2 - (6 - i)z + 10i$  par  $(z - z_0)$ .

3. Résoudre l'équation.

---

**Feuille d'exercices n° 7b**

NOMBRES COMPLEXES (DEUXIÈME PARTIE : TRIGONOMÉTRIE)

---

**3. Forme trigonométrique, argument**

**Exercice 1.** Écrire sous forme trigonométrique les nombres suivants :

- |                   |            |            |
|-------------------|------------|------------|
| a) $i$            | b) $1 + i$ | c) $1 - i$ |
| d) $\sqrt{3} + i$ | e) $-1$    | f) $1$     |

**Exercice 2.**

- Calculer le module et un argument de  $\frac{1 + i\sqrt{3}}{\sqrt{3} + i}$ .
- Écrire sous forme trigonométrique  $\left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i}\right)^4$ .

**Exercice 3.** Soient  $\theta \in \mathbf{R}$  et  $z = e^{i\theta}$ . Déterminer la forme trigonométrique de  $1 + z + z^2$ .

**Exercice 4.** Déterminer tous les entiers  $n \in \mathbf{N}$  tels que

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| a) $(1 + i)^n \in \mathbf{R}$ | b) $(\sqrt{3} + i)^n \in i\mathbf{R}$ |
|-------------------------------|---------------------------------------|

**Exercice 5.**

- Soient  $\theta \in ]-\pi, \pi[$  et  $t = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$ . Démontrer l'identité

$$e^{i\theta} = \frac{1 + it}{1 - it},$$

puis exprimer  $\cos \theta$  et  $\sin \theta$  en fonction de  $t$ .

- En déduire, pour tout  $x \in \mathbf{R}$ , une simplification de  $\cos(2 \arctan x)$  et  $\sin(2 \arctan x)$ .
- Démontrer que, pour tout  $z \in \mathbf{C} \setminus \mathbf{R}_-$ ,

$$\arg(z) \equiv 2 \arctan \left( \frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z) + |z|} \right) \pmod{2\pi}$$

**4. Racines de l'unité**

**Exercice 6.** Résoudre en  $z \in \mathbf{C}$  les équations suivantes :

- |                        |                                     |                                  |
|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| a) $z^3 = -8i$         | b) $z^5 - z = 0$                    | c) $27(z - 1)^6 + (z + 1)^6 = 0$ |
| d) $z^2 \bar{z}^7 = 1$ | e) $z^6 - (3 + 2i)z^3 + 2 + 2i = 0$ |                                  |

**Exercice 7.** Soit  $n \in \mathbf{N}^*$ .

1. Calculer la somme des racines  $n$ -ièmes de l'unité.
2. Calculer le produit des racines  $n$ -ièmes de l'unité.

3. On pose  $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$ . Calculer  $\sum_{k=0}^{n-1} (1 + \omega^k)^n$ .

(Indication : on pourra commencer par calculer  $\sum_{k=0}^{n-1} (\omega^j)^k$  pour tout  $j \in \{0, \dots, n\}$ )

**Exercice 8.** Soit  $z$  un nombre complexe. Prouver les identités suivantes :

$$\sum_{k=0}^{18} (z - e^{2ik\pi/19})^2 = 19z^2 \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^{18} |z - e^{2ik\pi/19}|^2 = 19(1 + |z|^2).$$

## 5. Angles remarquables

**Exercice 9.** On note  $z_1 = \frac{\sqrt{6} + i\sqrt{2}}{2}$  et  $z_2 = 1 + i$  puis on définit  $z_3 = \frac{z_1}{z_2}$ .

1. Écrire  $z_1$ ,  $z_2$  et  $z_3$  sous forme trigonométrique.
2. En déduire des expressions de  $\cos \frac{7\pi}{12}$  et  $\sin \frac{7\pi}{12}$ .

**Exercice 10.**

1. Résoudre algébriquement l'équation  $z^2 = 1 + i$ , d'inconnue  $z \in \mathbf{C}$ .
2. En déduire des expressions de  $\cos \frac{\pi}{8}$  et  $\sin \frac{\pi}{8}$ .

**Exercice 11.** On note  $\omega = e^{2i\pi/5}$ .

1. Quelle relation simple lie les nombres  $\cos(\frac{2\pi}{5})$  et  $\omega + \frac{1}{\omega}$  ?
2. Justifier l'identité  $(\omega + \frac{1}{\omega})^2 + (\omega + \frac{1}{\omega}) - 1 = 0$ .
3. Calculer  $\cos(\frac{2\pi}{5})$ .

## 6. D'autres applications à la trigonométrie

**Exercice 12.** Réduction de  $a \cos x + b \sin x$ .

1. Soient  $a$  et  $b$  deux réels. Démontrer qu'il existe  $r \in \mathbf{R}_+$  et  $\theta \in \mathbf{R}$  tels que

$$\forall x \in \mathbf{R}, a \cos x + b \sin x = r \cos(x + \theta).$$

2. Déterminer l'ensemble des  $x \in \mathbf{R}$  qui vérifient  $\cos x + \sin x = 1$ .

**Exercice 13.** Développer  $\cos(2\varphi)$  pour obtenir un polynôme en  $\cos(\varphi)$ , puis  $\sin(3\varphi)$  pour obtenir un polynôme en  $\sin(\varphi)$ .

**Exercice 14.** Pour tout  $n \in \mathbf{N}$  et tout  $\theta \in \mathbf{R}$ , calculer

$$\sum_{k=0}^n \cos(k\theta) \quad \text{et} \quad \sum_{k=0}^n \sin(k\theta).$$

---

Feuille d'exercices n° 7c

NOMBRES COMPLEXES (TROISIÈME PARTIE : GÉOMÉTRIE)

---

7. Polygones

**Exercice 1.** Soient  $u$  et  $v$  deux nombres complexes. Établir l'identité suivante, dite « du parallélogramme » :

$$|u + v|^2 + |u - v|^2 = 2(|u|^2 + |v|^2).$$

Pourquoi ce nom ?

**Exercice 2.** Soient  $a, b, c$  et  $d$  quatre nombres complexes distincts qui vérifient les deux relations :

$$a + c = b + d \quad \text{et} \quad a + ib = c + id.$$

Que peut-on dire du quadrilatère formé des quatre points ayant ces nombres complexes pour affixes ?

**Exercice 3.** Soient  $a, b$  et  $c$  trois nombres complexes qui sont affixes de trois points formant dans le plan un triangle équilatéral. Montrer que :

$$\left(\frac{a - c}{b - c}\right)^3 = -1.$$

**Exercice 4.** Soit  $\theta$  un nombre réel, avec  $0 \leq \theta \leq \pi$ .

1. Déterminer l'ensemble des solutions complexes de l'équation :  $z^6 - 2z^3 \cos \theta + 1 = 0$ .
2. Pour quelles valeurs de  $\theta$  ces solutions sont-elles les affixes des sommets d'un hexagone régulier ?

8. Transformations affines

**Exercice 5.** Rappeler l'expression en terme de nombres complexes des transformations suivantes :

1. La translation de vecteur  $v \in \mathbf{C}$ .
2. L'homothétie de centre  $a \in \mathbf{C}$  et de rapport  $\lambda \in \mathbf{R}^*$ .
3. La rotation de centre  $a \in \mathbf{C}$  et d'angle  $\theta \in \mathbf{R}$ .
4. La symétrie par rapport à un axe passant par  $a \in \mathbf{C}$  et faisant un angle  $\theta \in \mathbf{R}$  avec l'axe réel.

**Exercice 6.** On rappelle l'identification canonique entre  $\mathbf{R}^2$  et  $\mathbf{C}$  via l'application affixe et sa réciproque :

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{R}^2 & \rightarrow & \mathbf{C} \\ (x, y) & \mapsto & x + iy \end{array} \quad \text{et} \quad \begin{array}{ccc} \mathbf{C} & \rightarrow & \mathbf{R}^2 \\ z & \mapsto & (\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z) \end{array} .$$

1. Identifier les transformations du plan ayant l'écriture complexe suivante :

$$\begin{array}{lll} \text{a) } f_1(z) = z + 3 - 2i, & \text{b) } f_2(z) = e^{i2\pi/7}z, & \text{c) } f_3(z) = e^{i2\pi/3}z - 1, \\ \text{d) } f_4(z) = 3z - 5 + i, & \text{e) } f_5(z) = (2 + 2i)z + 3i. \end{array}$$

2. Donner l'écriture complexe des transformations du plan suivantes :

- (a) La translation du vecteur d'affixe  $-2 + i$  ;
- (b) La symétrie centrale de centre  $i$  ;
- (c) La rotation d'angle  $\pi/6$  et de centre  $1$  ;
- (d) L'homothétie de rapport  $3$  et de centre d'affixe  $1 + 2i$  ;
- (e) La similitude de rapport  $2$  et d'angle  $\pi/3$  et de centre  $1 + i$ .

3. Décrire géométriquement et déterminer la nature des similitudes correspondant aux applications suivantes :

$$\varphi_1 : z \mapsto \left( \frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) z + 3, \quad \varphi_2 : z \mapsto i \bar{z}.$$

- 4. Démontrer que la composée de deux symétries est une translation ou une rotation.
- 5. Démontrer que la composée de deux rotations est une translation ou une rotation.

**Exercice 7.** Soit  $s$  une similitude directe telle que  $s(2 - i) = 1$  et  $s(-1 + 2i) = 1 + 6i$ . Déterminer l'homothétie  $h$  et la rotation  $r$  telles que  $s = h \circ r$ . Donner l'affixe du point fixe de  $s$ .

**Exercice 8.** On dit qu'un ensemble d'applications  $E$  est *stable par composition* si  $f \circ g \in E$  pour toutes applications  $f, g \in E$ . Les ensembles suivants de transformations planes sont-ils ou non stables par composition ?

- 1. L'ensemble des translations ?
- 2. L'ensemble des homothéties ?
- 3. L'ensemble des homothéties de rapport strictement supérieur à  $1$  ?
- 4. L'ensemble des homothéties et des translations ?
- 5. L'ensemble des symétries par rapport à des droites ?
- 6. L'ensemble des rotations ?
- 7. L'ensemble des symétries et des rotations ?
- 8. L'ensemble des symétries, des rotations et des translations ?
- 9. L'ensemble des similitudes directes ?

**Exercice 9.** On se place dans le plan complexe. Soit  $j$  le nombre complexe de module 1 et d'argument  $\frac{2\pi}{3}$ . Soit  $r$  la transformation du plan, qui, à un point  $M$  d'affixe  $z$ , associe le point  $M_0$  d'affixe  $z_0 = jz + 3$ .

1. Déterminer les points invariants (points fixes) de  $r$ , et la nature de la transformation  $r$ .
2. Soit  $M$  un point d'affixe  $z$ . Calculer l'affixe du point  $r^2(M)$ , où on note  $r^2 = r \circ r$ , et déterminer la nature de la transformation  $r^2$ .
3. Soit  $M$  un point d'affixe  $z$ . Calculer l'affixe du point  $r^3(M)$ , où  $r^3 = r \circ r \circ r$ . Que peut-on dire de la transformation  $r^{-1}$  du plan ?

**Exercice 10.** On identifie  $\mathbf{R}^2$  et  $\mathbf{C}$ . On considère la transformation  $f : \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$  définie, pour  $z \in \mathbf{C}$ , par

$$f(z) = 2\bar{z} + 3 - 4i.$$

1. Calculer le(s) point(s) fixe(s) de  $f$ .
2. Quelle est la nature de l'application  $f$  ?
3. Donner une équation cartésienne du cercle  $C$  de centre  $1 - i$  et de rayon 2.
4. Calculer  $f(1 - i)$ . En déduire une équation cartésienne de l'image de  $C$  par la transformation  $f$ .

**Exercice 11.** Soient  $f$  et  $g$  les deux transformations du plan complexe définies par  $f(z) = -z - 2i$  et  $g(z) = 2z - 1 - i$ .

1. Déterminer les points fixes de  $f$  et  $g$ .
2. Démontrer que  $f$  et  $g$  sont deux homothéties dont on donnera le centre et le rapport.
3. Démontrer que  $f \circ g$  est une homothétie dont on donnera le centre et le rapport.
4. Démontrer que ces trois centres sont alignés.

## 9. Quelques ensembles de points

**Exercice 12.** Pour chacune des relations suivantes, déterminer l'ensemble des nombres complexes  $z$  qui la vérifient :

- |                              |   |  |   |
|------------------------------|---|--|---|
| a) $ (1 - i)z - 3i  = 3$     | b) $ 1 - z  \leq 1/2$                   | c) $\operatorname{Re}(1 - z) \leq \frac{1}{2}$ | d) $\operatorname{Re}(iz) \leq \frac{1}{2}$ |
| e) $ 1 - \frac{1}{z} ^2 = 2$ | f) $\left  \frac{z-3}{z-5} \right  = 1$ | g) $\left  \frac{z-3}{z-5} \right  = 2$        | h) $\left  \frac{z-3}{z-5} \right  < 2$     |

**Exercice 13.** Montrer que, dans le plan complexe, l'ensemble  $\left\{ \frac{1}{1 + it}, t \in \mathbf{R} \right\}$  est contenu dans le cercle de centre  $1/2$  et de rayon  $1/2$ . Est-ce le cercle tout entier ?