

## TD 15 : Espaces vectoriels de dimension finie

**Exercice 1.** Montrer que  $((1, 1, 1), (2, 1, 1), (2, 1, 2))$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ . Calculer les coordonnées du vecteur  $(a, b, c)$  dans cette base.

**Exercice 2.** Montrer qu'une famille de vecteurs est une base à l'aide de la dimension.

- On considère l'espace vectoriel  $E = \mathbb{R}_3[X]$  et les polynômes

$$P_1 = X^3 + X, \quad P_2 = X^3 - 2X^2, \\ P_3 = X^2 + 3X \quad \text{et} \quad P_4 = X - 1.$$

Montrer que  $(P_1, P_2, P_3, P_4)$  est une base de  $\mathbb{R}_3[X]$ .

- On considère l'espace vectoriel  $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  et les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \\ C = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Montrer que  $(A, B, C, D)$  est une base de  $E$ .

- Soit  $E$  un espace vectoriel de dimension 3 et  $(e_1, e_2, e_3)$  une base de  $E$ . On définit les vecteurs

$$u_1 = e_2 + 3e_3, \quad u_2 = e_3 - e_1 \quad \text{et} \quad u_3 = e_1 + 2e_2.$$

Montrer que  $(u_1, u_2, u_3)$  est une base de  $E$ .

- Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On définit  $P_0 = 1$  et  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,

$$P_k = \prod_{i=0}^{k-1} (X - i).$$

Montrer que  $(P_0, P_1, \dots, P_n)$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .

**Exercice 3.** On définit les vecteurs de  $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$  suivants :

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \\ u_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

On définit les espaces vectoriels  $F_1 = \text{Vect}(u_1)$ ,  $F_2 = \text{Vect}(u_1, u_2)$ ,  $\dots$ ,  $F_5 = \text{Vect}(u_1, \dots, u_5)$ , et  $G = \text{Vect}(u_4, u_5)$ .

- Déterminer les dimensions de  $F_1, F_2, F_3, F_4, F_5$  et celle de  $G$ .
- On étudie l'ensemble  $F_3 \cap G$ .
  - Montrer que  $F_3 \cap G$  est un sous espace-vectoriel de  $\mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$ .

b. Pour  $v = \alpha u_4 + \beta u_5$  un élément de  $G$ , avec  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ , montrer que :  $v \in F_3 \Leftrightarrow \alpha + \beta = 0$ .

c. En déduire que  $F_3 \cap G$  est de dimension 1 et préciser un vecteur qui l'engendre.

- En s'inspirant de la question précédente, déterminer  $\dim(F_2 \cap G)$  et  $\dim(F_4 \cap G)$ .

**Exercice 4.** Calculer le rang des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 & 0 \\ 2 & 9 & 5 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 1 \\ 1 & \cdots & 1 & n \end{pmatrix} \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}^*.$$

**Exercice 5.** On considère l'application linéaire

$$f : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z, t) \mapsto (x + y + 2z, y + z - t, x - y + 2t)$$

- Déterminer une base de  $\text{Ker}(f)$ .
- À l'aide du théorème du rang, déduire la dimension de  $\text{Im}(f)$ .
- Déterminer une base de  $\text{Im}(f)$ .

**Exercice 6.** On considère un espace vectoriel  $E$  de dimension  $n \geq 1$ . Soit  $f \in \mathcal{L}(E)$  telle que  $f \circ f = 0_{\mathcal{L}(E)}$ .

- Montrer que  $\text{Im}(f) \subset \text{Ker}(f)$ .
- En déduire que  $\text{rg}(f) \leq \frac{n}{2}$ .

**Exercice 7.** Soit  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ . Montrer qu'il existe un unique polynôme  $Q \in \mathbb{R}_n[X]$  tel que  $P = Q' + Q$ .

**Exercice 8.** Déterminer le rang de l'application

$$f : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ A \mapsto A^t - A$$

**Exercice 9.** On note  $E = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$  l'espace vectoriel des suites réelles, et  $a, b$  deux nombres réels fixés tels que  $a^2 + 4b > 0$ . On définit

$$F = \{(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E \mid \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n\}$$

et

$$\varphi : F \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} \mapsto (u_0, u_1).$$

- Montrer que  $F$  est un sous espace vectoriel de  $E$ .
- Déterminer  $r$  et  $s$  deux réels distincts tels que  $(r^n)_{n \in \mathbb{N}} \in F$  et  $(s^n)_{n \in \mathbb{N}} \in F$ .

3. Montrer que  $(r^n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(s^n)_{n \in \mathbb{N}}$  forment une famille libre et en déduire que  $\dim(F) \geq 2$ .
4. Montrer que  $\varphi$  est linéaire puis montrer à l'aide d'une récurrence, que  $\text{Ker}(\varphi) = \{0_E\}$ .
5. En déduire que  $F$  est de dimension 2.

**Exercice 10.** Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $n \in \mathbb{N}$ . On considère les polynômes  $P_k = (X - a)^k$  pour  $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$ .

1. Montrer que  $(P_k)_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket}$  est une base de  $\mathbb{R}_n[X]$ .
2. Quelles sont les coordonnées de  $P \in \mathbb{R}_n[X]$  dans cette base?