

## TD 17 : Matrices d'applications linéaires

**Exercice 1.** Soit  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ , et soient  $e_1 = (1, 0, 0)$ ,  $e_2 = (1, -1, 0)$ ,  $e_3 = (1, 1, 1)$ , et  $f_1 = (0, 1, 1)$ ,  $f_2 = (1, 0, 1)$ ,  $f_3 = (1, 1, 0)$ .

1. Montrer que  $\mathcal{E} = (e_1, e_2, e_3)$  et  $\mathcal{F} = (f_1, f_2, f_3)$  sont des bases de  $\mathbb{R}^3$ .
2. Écrire les matrices de passage de  $\mathcal{B}$  vers  $\mathcal{E}$ ,  $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{E}}$ , et de  $\mathcal{B}$  vers  $\mathcal{F}$ ,  $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}$ .
3. En déduire la matrice de passage de  $\mathcal{E}$  vers  $\mathcal{F}$ .

**Exercice 2.** Déterminer les matrices dans les bases canoniques des applications linéaires suivantes :

1.  $f : \begin{cases} \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) \mapsto (2x - y, x + y - z, y - 3z) \end{cases}$
2.  $g : \begin{cases} \mathbb{R}_3[X] \rightarrow \mathbb{R}_3[X] \\ P \mapsto XP' - P \end{cases}$

**Exercice 3.** Pour chacune des matrices suivantes, déterminer l'image et le noyau (en en donnant une base) de l'application linéaire canoniquement associée :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix},$$

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & -2 \\ 9 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 4.** On note  $E = \mathbb{R}_3[X]$  et  $\mathcal{B}$  sa base canonique. On considère les endomorphismes de  $E$  suivants :

$$f : \begin{cases} E \rightarrow E \\ P \mapsto P(X+1) \end{cases} \quad \text{et} \quad g : \begin{cases} E \rightarrow E \\ P \mapsto P(X-1) \end{cases}$$

1. Calculer les matrices  $M = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(f)$  et  $N = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(g)$ .
2. Montrer que  $f \circ g = \text{Id}_E$ .
3. En déduire sans calcul que la matrice  $N$  est l'inverse de  $M$ .
4. Généraliser le résultat précédent pour déterminer l'inverse de la matrice de  $\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$  suivante

$$\begin{pmatrix} 1 & \binom{1}{1} & \binom{2}{2} & \cdots & \binom{n}{n} \\ & 1 & \binom{2}{1} & \cdots & \binom{n}{n-1} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & (0) & & 1 & \binom{n}{1} \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$$

**Exercice 5.** Soit  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  dont la matrice dans la base canonique de  $\mathbb{R}^3$  est  $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ .

1. On note  $u = (1, -1, 1)$  et  $v = (0, -1, 2)$ . Calculer  $f(u)$  et  $f(v)$  et exprimer ces vecteurs comme combinaison linéaire de  $u$  et de  $v$ .
2. Justifier que  $\mathcal{B} = (u, v, (1, 0, 0))$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .
3. Déterminer la matrice de  $f$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

*Indication.* C'est la matrice des coordonnées des vecteurs  $f(u)$ ,  $f(v)$  et  $f(1, 0, 0)$  dans la base  $\mathcal{B}$ , et pas dans la base canonique.

4. En déduire que  $f^2 = \text{Id}_{\mathbb{R}^3}$  et vérifier ce résultat directement à partir de la matrice  $A$ .

**Exercice 6.** On considère  $f \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^3)$  telle que sa matrice

dans la base canonique est  $\begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ .

Déterminer une base  $\mathcal{B}$  de  $\mathbb{R}^3$  telle que

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

**Exercice 7.** On considère l'espace vectoriel  $\mathbb{R}^2$  muni de sa base canonique  $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$ . Soit  $u$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  donné par

$$u(e_1) = e_1 + e_2, \quad u(e_2) = -e_1 + 2e_2.$$

1. Déterminer la matrice de  $u$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
2. Soit  $v = xe_1 + ye_2$ . Déterminer la matrice de  $u(v)$  dans la base  $\mathcal{B}$ .
3. On pose  $f_1 = e_2$  et  $f_2 = e_1 + e_2$ . Vérifier que  $\mathcal{F} = (f_1, f_2)$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ .
4. Déterminer  $P_{\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{F}}$  et  $P_{\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{B}}$ .
5. En utilisant la formule de changement de base, en déduire la matrice de  $u$  dans la base  $\mathcal{F}$ , puis les expressions de  $u(f_1)$  et  $u(f_2)$  en fonction de  $f_1$  et  $f_2$ .

**Exercice 8.** On considère les polynômes  $P_1 = X^2 + 1$ ,  $P_2 = X + 1$ ,  $P_3 = 2X^2 - X$ , et on note  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$ .

1. Montrer que  $\mathcal{B}' = (P_1, P_2, P_3)$  forme une base de  $\mathbb{R}_2[X]$ .
2. Écrire la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$ , puis celle de  $\mathcal{B}'$  à  $\mathcal{B}$ .
3. Soit  $P(X) = X^2 - X + 2$ . Donner les coordonnées de  $P$  dans  $\mathcal{B}'$ .
4. On considère l'endomorphisme de  $\mathbb{R}_2[X]$  donné par  $\theta(P) = XP'$ . Déterminer la matrice de  $\theta$  dans la base  $\mathcal{B}'$ .