



# Fiche de synthèse n°1


## Structure spatiale des espèces chimiques

### 1. Chiralité

Un objet est dit **chiral** s'il n'est pas superposable à son image dans un miroir plan. On appelle **énantiomérisme** la relation existant entre cet objet et son image.

Les molécules peuvent également être chirales si elles possèdent au moins un **atome de carbone asymétrique** et ne présentent pas d'axe, de plan ou de centre de symétrie. Un atome de carbone asymétrique est un atome de carbone avec 4 substituants différents.

**Exemple** : Représentation des deux énantiomères du butan-2-ol



**Remarque** : Ces deux molécules sont des stéréoisomères de configuration.

### 2. Molécules avec un atome de carbone asymétrique


Pour différencier des énantiomères, il est nécessaire d'étudier la configuration absolue du (des) atome(s) de carbone asymétrique(s) présent(s) dans les molécules.

#### 2.1. Règles CIP

Trois chimistes ont travaillé sur la chiralité et ont proposé des règles à suivre pour déterminer la configuration absolue d'un atome de carbone asymétrique : ceux sont les **règles CIP** (Cahn, Ingold et Prelog).


##### Règle n°1 :

Un atome de **numéro atomique** plus élevé a la priorité sur un atome de numéro atomique le plus faible



##### Règle n°2 :

En cas d'égalité pour les atomes au 1<sup>er</sup> rang, on applique la même règle aux atomes qui leurs sont liés (2<sup>nd</sup> rang), et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteigne une différence.



**Règle n°3 :**

Une liaison multiple équivaut à plusieurs liaisons simples entre les 2 atomes


Ex :	-C(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	>	-CH=CH <sub>2</sub>	>	-CH(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>
1 <sup>er</sup> rang :	C	=	C	=	C
2 <sup>nd</sup> rang :	(C,C,C)	>	(H,C,C)	=	(H,C,C)
3 <sup>ème</sup> rang :			(H,H,C)	>	(H,H,H)

**2.2. Configuration absolue**

Une fois que l'on a identifié l'ordre de priorité, on peut classer les groupes liés à un atome de carbone asymétrique C\* par ordre de priorité : 1 > 2 > 3 > 4. On regarde ensuite dans l'axe C\* → 4 et on observe dans l'ordre de priorité décroissant 1-2-3 les 3 autres substituants.


On aura alors deux configurations absolues possibles : la **configuration R** ou la **configuration S**.

Exemple :



Configuration (R)

Les substituants défilent par priorité décroissante dans le sens des aiguilles d'une montre.



Configuration (S)

Les substituants défilent par priorité décroissante dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.


**3. Molécules avec deux atomes de carbone asymétriques**

Lorsque l'on a deux atomes de carbone asymétriques côte à côte dans une même molécule, il est possible de représenter cette molécule de quatre façons différentes : on obtient alors 4 isomères.

Les isomères images l'un de l'autre par un miroir plan sont des **énantiomères**.

Les isomères qui ne sont pas images l'un de l'autre par un miroir plan sont des **diastéréoisomères**.

Exemple avec les différents isomères du **1-bromo-1,2-dichloro-2-iodoethane**



Deux énantiomères et deux diastéréoisomères sont fondamentalement différents :


- Pour un couple d'énantiomères, les distances entre atomes non liés sont identiques. Les énantiomères possèdent alors les mêmes propriétés physiques et chimiques. Seul le signe du pouvoir rotatoire les distingue.
- Pour deux diastéréoisomères certaines distances entre atomes non liés ou des valeurs d'angles sont forcément différentes. Leurs propriétés physiques et chimiques sont alors différentes (point de fusion, solubilité, pKa, densité, ...)

#### 4. Isomérisation Z et E


L'isomérisation Z et E ne s'applique qu'aux molécules possédant des doubles liaisons C=C. Pour chaque atome de carbone d'une double liaison C=C on détermine les substituants prioritaires, d'après les règles CIP.

Si les deux premiers substituants prioritaires sont du même côté de la double liaison, il s'agit de l'**isomère Z** (Zusammen)

Si les deux premiers substituants prioritaires sont de chaque côté de la double liaison, il s'agit **isomère E** (Entgegen)



(Z)-3-méthylpent-2-ène



(E)-3-méthylpent-2-ène

Exemple :

Comme ces deux isomères (Z et E) ne sont pas images l'un de l'autre et ne se superposent pas, ce sont des diastéréoisomères.